



למה כסף שנשאר בחיסכון גדל מהר יותר ויותר, ואיך
מזה נולדת נוסחה אחת לכל תהליך של גדילה ודעיכה

כ־20 דקות קריאה

2 הוכחות

גדילה ודעיכה

3-5 יח"ל

כיתות ו'א-י"ב

מה כדאי לדעת קודם

- אחוזים: $p\%$ מתוך x הם $\frac{p}{100} \cdot x$.
- חוקי חזקות: $q^2 \cdot q = q^3$.
- הוצאת גורם משותף.
- סדרה הנדסית (להוכחה 2).

מה תמצאו כאן

- אינטואיציה: ריבית פשוטה מול ריבית דריבית – "ריבית על הריבית".
- הוכחה 1: עוקבים אחרי הכסף שנה אחרי שנה.
- הוכחה 2: הסכומים בחיסכון הם סדרה הנדסית.
- מבט נוסף: איפה "מסתתרת" הריבית על הריבית.
- שימושים: דעיכה, זמן הכפלה, ריבית חודשית והמספר e .


1 האינטואיציה: כדור שלג של כסף

האינטואיציה

נועה ואיתי מפקידים כל אחד 1,000 ₪ בתוכנית חיסכון שנותנת ריבית של 10% בשנה. **איתי** מושך בסוף כל שנה את הריבית ושם אותה בקופה בבית. בחיסכון שלו נשארים תמיד 1,000 ₪, ולכן בכל שנה הוא מקבל בדיוק 100 ₪, וכל הכסף שלו – בחיסכון ובקופה יחד – גדל ב־100 ₪ בשנה. זאת **ריבית פשוטה**.
נועה משאירה את הריבית בחיסכון. בסוף השנה הראשונה יש לה 1,100 ₪, ובשנה השנייה הבנק מחשב 10% מ־1,100 ₪, כלומר 110 ₪. גם הריבית שהיא כבר קיבלה מרוויחה ריבית. זאת **ריבית דריבית** – "ריבית על הריבית".
ריבית דריבית מתנהגת כמו כדור שלג שמתגלגל במורד: ככל שהוא גדול יותר, הוא אוסף יותר שלג בכל סיבוב.

שנה	0	1	2	3	4	5
איתי – ריבית פשוטה (₪)	1,000	1,100	1,200	1,300	1,400	1,500
נועה – ריבית דריבית (₪)	1,000	1,100	1,210	1,331	1,464.10	1,610.51

בהתחלה ההבדל זעיר: אחרי שנתיים יש לנועה רק 10 ₪ יותר. אבל הפער הולך וגדל. אחרי 20 שנה יש לאיתי 3,000 ₪, ולנועה כמעט 6,730 ₪ – יותר מפי שניים (סרטוט 1). הסיבה: אצל איתי הסכום עולה בכל שנה **באותו מספר שקלים**, ואצל נועה הוא **מוכפל באותו מספר**, 1.1.



סרטוט 1: הכסף של איתי ושל נועה במשך 20 שנה. ריבית פשוטה נותנת קו ישר, ריבית דריבית – עקומה שנעשית תלולה יותר ויותר.

2 הנוסחה

נסמן:

- M_0 – הסכום ההתחלתי (הקרו).
- p – אחוז הריבית לתקופה. למשל, בריבית של 5% לשנה: $p = 5$.
- n – מספר התקופות (שנים, חודשים וכדומה).
- M_n – הסכום אחרי n תקופות.

נוסחת ריבית דריבית

אם בסוף כל תקופה מצטרפת לחיסכון ריבית של $p\%$ מהסכום שיש בו באותו רגע, אז אחרי n תקופות:

$$M_n = M_0 \cdot q^n$$

$$q = 1 + \frac{p}{100}$$

המספר q נקרא **גורם הגדילה**. למשל, בריבית של 10% גורם הגדילה הוא $q = 1.1$.
במילים: בכל תקופה הסכום **מוכפל** ב- q . אחרי n תקופות הוא הוכפל ב- q^n בדיוק n פעמים.

אותה נוסחה מתארת גם **דעיכה** – ירידה באחוז קבוע בכל תקופה. אז $q = 1 - \frac{p}{100}$, מספר שקטן מ-1 (פרטים בשימוש 2).

בספרים אחרים תפגשו את אותה נוסחה בסימונים אחרים, למשל $A = P(1+r)^n$. שם P הוא הקרן ו- r הוא הריבית כשבר עשרוני: ריבית של 5% היא $r = 0.05$, ולכן $1 + r$ הוא בדיוק q . זאת אותה נוסחה.

3 הוכחה 1: שנה אחרי שנה

הרעיון נעקוב אחרי הכסף שנה אחרי שנה. נגלה שבכל שנה קורה אותו דבר בדיוק: הסכום מוכפל ב- q . מכאן הנוסחה נובעת כמעט מעצמה.

צעד מקדים: להוסיף $p\%$ זה לכפול ב- q


אם לסכום x מוסיפים $p\%$ ממנו, מקבלים

$$x + \frac{p}{100} \cdot x = x \left(1 + \frac{p}{100}\right) = x \cdot q.$$

למשל, להוסיף 10% זה לכפול ב- 1.1 . אצלנו: $1,000 + 100 = 1,000 \cdot 1.1 = 1,100$. זה כל הסוד:

הוספה של אחוז קבוע היא כפל במספר קבוע.

מעקב אחרי הכסף



בכל שנה הריבית מחושבת על **כל** הסכום שיש בחיסכון באותו רגע: הקרן, ועוד כל הריבית שכבר הצטרפה אליה. בסרטוט 2 כל עמודה בנויה מהעמודה הקודמת (בכחול) ועוד 10% ממנה (בכתום). שימו לב: גם החלק הכתום — הריבית השנתית — גדל משנה לשנה: $100, 110, 121, \dots$

סרטוט 2: הסכום בסוף כל שנה: הסכום הקודם (כחול) ועוד 10% ממנו (כתום).

נכתוב את אותו מעקב באותיות, עבור ריבית כלשהי $p\%$:

נימוק	טענה
בסוף השנה הראשונה: הקרן ועוד הריבית עליה	$M_1 = M_0 + \frac{p}{100} \cdot M_0$ ①
הוצאת M_0 כגורם משותף (הצעד המקדים)	$M_1 = M_0 \cdot q$ ②
בשנה השנייה הריבית מחושבת על M_1 , כל הסכום שבחיסכון	$M_2 = M_1 + \frac{p}{100} \cdot M_1 = M_1 \cdot q$ ③
הצבה של צעד 2	$M_2 = (M_0 \cdot q) \cdot q = M_0 \cdot q^2$ ④
אותו נימוק בשנה השלישית, והצבה של צעד 4	$M_3 = M_2 \cdot q = M_0 \cdot q^3$ ⑤

ומה קורה אחרי n שנים?

התבנית ברורה: בכל שנה הסכום מוכפל ב- q , ולכן

$$M_n = M_0 \cdot \underbrace{q \cdot q \cdots q}_n = M_0 \cdot q^n.$$

אבל "התבנית ברורה" זה עדיין לא הוכחה: מי מבטיח שהיא נמשכת גם בשנה ה-50? הנימוק הוא שבכל מעבר משנה לשנה פועל אותו כלל בדיוק, $M_{k+1} = M_k \cdot q$ (כמו בצעד 3). זה כמו שורה של אבני דומינו:

- **האבן הראשונה נופלת:** הנוסחה נכונה אחרי שנה אחת, $M_1 = M_0 \cdot q^1$ (צעד 2).
- **כל אבן מפילה את הבאה:** נניח שהנוסחה נכונה אחרי k שנים, כלומר $M_k = M_0 \cdot q^k$. אחרי שנה נוספת הסכום מוכפל שוב ב- q :

$$M_{k+1} = M_k \cdot q = M_0 \cdot q^k \cdot q = M_0 \cdot q^{k+1},$$

ולכן הנוסחה נכונה גם אחרי $k + 1$ שנים.

כך הנוסחה נכונה אחרי שנה אחת, ולכן גם אחרי שנתיים, ולכן גם אחרי שלוש שנים – וכן הלאה, לכל n . לשיטת ההוכחה הזאת קוראים **אינדוקציה מתמטית**.

מש"ל

✓ עצרו ובדקו


בצעד 3 חישבנו את הריבית של השנה השנייה מתוך M_1 . מה היה יוצא אילו הבנק היה מחשב אותה מתוך M_0 , כמו אצל איתי? איזו נוסחה הייתה מתקבלת אחרי n שנים? (התשובה בסוף המסמך).

4 הוכחה 2: סדרה הנדסית

הרעיון נרשום בשורה אחת את הסכום ההתחלתי ואת הסכומים בסוף כל שנה: $M_0, M_1, M_2, \dots$. נראה שזאת סדרה הנדסית, ונשתמש בנוסחה המוכנה לאיבר הכללי שלה.

תזכורת. בסדרה הנדסית כל איבר מתקבל מהאיבר הקודם על ידי כפל באותו מספר – **מנת הסדרה**. אם האיבר הראשון הוא a_1 והמנה היא q , האיבר שנמצא במקום ה- m הוא

$$a_m = a_1 \cdot q^{m-1}.$$



סרטוט 3: הסכומים בחיסכון הם סדרה הנדסית. שימו לב: הסכום של שנה n נמצא במקום ה- $(n + 1)$.

טענה	נימוק
① $\frac{M_{k+1}}{M_k} = q$ לכל k	בכל שנה הסכום מוכפל ב- q (הצעד המקדים של הוכחה 1)
② הסדרה $M_0, M_1, M_2, \dots$ היא סדרה הנדסית שמנתה q	המנה בין כל שני איברים סמוכים קבועה
③ $a_1 = M_0$, ובאופן כללי $M_n = a_{n+1}$	הסדרה מתחילה בשנה 0, ולכן הסכום של שנה n נמצא במקום ה- $(n+1)$ (סרטוט 3)
④ $a_{n+1} = a_1 \cdot q^{(n+1)-1} = a_1 \cdot q^n$	נוסחת האיבר הכללי, עם $m = n + 1$
⑤ $M_n = M_0 \cdot q^n$	הצבה של צעד 3 בצעד 4

מש"ל

ומה עם ריבית פשוטה? שם בכל שנה **מוסיפים** את אותו סכום, $d = \frac{p}{100} \cdot M_0$, ולכן הסכומים הם **סדרה חשבונית**:

$$M_n = M_0 + n \cdot d = M_0 \left(1 + \frac{n \cdot p}{100} \right).$$


ההבדל בין שני סוגי הריבית הוא בדיוק ההבדל בין סדרה חשבונית (חיבור קבוע) לסדרה הנדסית (כפל קבוע).

5 שתי הדרכים זו מזו

הוכחה 1: שנה אחרי שנה	הוכחה 2: סדרה הנדסית
הרעיון עוקבים אחרי הכסף ומגלים שבכל שנה הוא מוכפל ב- q	מזהים שהסכומים הם סדרה הנדסית
הכלים אחוזים, גורם משותף, חוקי חזקות ואינדוקציה	הגדרת סדרה הנדסית ונוסחת האיבר הכללי
הנקודה העדינה להראות שהתבנית נמשכת לכל n (הדומינו)	האינדקס: M_n הוא האיבר ה- $(n+1)$
היתרון בונה את הנוסחה מאפס ומסבירה אותה	קצרה, ומחברת את הנושא לסדרות

6 מבט נוסף: איפה מסתתרת "הריבית על הריבית"?

כמה בדיוק מרוויחים מריבית דריבית לעומת ריבית פשוטה? נבדוק שנתיים. נכתוב את הריבית כשבר עשרוני, $r = \frac{p}{100}$, כך ש- $q = 1 + r$, ונניח לרגע שהקרן היא 1 ש.



סרטוט 4: $(1+r)^2 = 1 + 2r + r^2$. כדי שיהיה קל לראות, הריבית בסרטוט מוגזמת.

הסכום אחרי שנתיים הוא $(1+r)^2$ – השטח של ריבוע שצלעו $1+r$. 1. נחלק את הריבוע לארבעה חלקים:

- ריבוע $1 \cdot 1$ – הקרן.
- מלבן $1 \cdot r$ – הריבית של השנה הראשונה.
- מלבן $r \cdot 1$ – הריבית של השנה השנייה על הקרן.
- ריבוע קטן $r \cdot r = r^2$ – הריבית שנוספה בשנה השנייה על הריבית של השנה הראשונה.

שלושת החלקים הראשונים, $1 + 2r$, הם בדיוק מה שנותנת ריבית פשוטה. הריבוע הקטן הוא ה"בונוס" – הריבית על הריבית.

באלגברה:

$$M_0(1+r)^2 = M_0(1+2r+r^2) = \underbrace{M_0(1+2r)}_{\text{ריבית פשוטה}} + \underbrace{M_0 r^2}_{\text{הבונוס}}$$

אצל נועה ואיתי: בריבית פשוטה יש אחרי שנתיים $1,000 \cdot 1.2 = 1,200$, והבונוס הוא $10 = 1,000 \cdot 0.1^2$ – בדיוק ההפרש של 10 ש שראינו בטבלה.

אחרי שלוש שנים מקבלים קובייה: $(1+r)^3 = 1 + 3r + 3r^2 + r^3$. ובאופן כללי: כשפותחים את הסוגריים ב- $(1+r) \cdot (1+r) \cdot \dots \cdot (1+r)$, בוחרים מכל סוגריים 1 או r . אם בוחרים 1 מכלם, מקבלים 1; אם בוחרים r מסוגריים אחד בלבד, יש לכך n אפשרויות, וביחד הן נותנות $n \cdot r$; כל שאר הבחירות נותנות מכפלות חיוביות. לכן, כאשר $r > 0$,

$$(1+r)^n = 1 + n \cdot r + (\text{עוד איברים חיוביים}) \geq 1 + n \cdot r.$$

כלומר, ריבית דריבית נותנת תמיד לפחות כמו ריבית פשוטה, והפער – כל האיברים עם r^2, r^3 וכן הלאה – הוא "הריבית על הריבית". אי-השוויון הזה נקרא **אי-שוויון ברנולי**. את המקדמים המדויקים – כמו 1, 3, 3, 1 בקובייה – נותן **הבינום של ניוטון**.

7 מה עושים עם הנוסחה?

שימוש 1: כמה יהיה בחיסכון?

דוגמה מספרית


הפקידו 10,000 ש בחיסכון עם ריבית דריבית של 4% לשנה. כמה כסף יהיה בחיסכון אחרי 5 שנים? ואחרי 15 שנים?

$$q = 1 + \frac{4}{100} = 1.04$$

אחרי 5 שנים: $M_5 = 10,000 \cdot 1.04^5 \approx 12,166.53$

אחרי 15 שנים: $M_{15} = 10,000 \cdot 1.04^{15} \approx 18,009.44$

שימוש 2: דעיכה – כשהערך יורד



סרטוט 5: $M_n = 100 \cdot q^n$ לשלושה ערכים של q .

אם ערך יורד ב- $p\%$ בכל תקופה, אז מכל סכום x נשאר

$$x - \frac{p}{100} \cdot x = x \left(1 - \frac{p}{100}\right).$$

כלומר, גם כאן הסכום **מוכפל** בכל תקופה באותו מספר, $q = 1 - \frac{p}{100}$, ושתי ההוכחות תקפות בלי שום שינוי. ההבדל היחיד: עכשיו $q < 1$, ולכן הסכום הולך וקטן.

לפי q יודעים מה קורה: $q > 1$ – גדילה; $q = 1$ – אין שינוי; $0 < q < 1$ – דעיכה.

דוגמה מספרית

מכונית נקנתה ב-120,000 ש"ח, וערכה יורד ב-15% בכל שנה. מה ערכה אחרי 3 שנים?
 $q = 1 - \frac{15}{100} = 0.85$, ולכן ש"ח $M_3 = 120,000 \cdot 0.85^3 = 120,000 \cdot 0.614125 = 73,695$.

שימוש 3: תוך כמה זמן הסכום יוכפל?

בריבית של 7% לשנה, אחרי כמה שנים הסכום יוכפל? צריך למצוא n שבו $M_0 \cdot 1.07^n \geq 2M_0$, כלומר $1.07^n \geq 2$. שימו לב: הקרן מצטמצמת, ולכן זמן ההכפלה **לא תלוי בקרן** – 100 ש"ח ומיליון ש"ח מוכפלים באותו זמן.

בניסוי וטעייה: $1.07^{10} \approx 1.967$ (עוד לא), $1.07^{11} \approx 2.105$ (כבר כן). לכן הסכום מוכפל אחרי 11 שנים. מי שמכיר לוגריתמים יכול לפתור ישירות: $n = \frac{\log 2}{\log 1.07} \approx 10.24$.

יש גם כלל אצבע מפורסם, **כלל ה-72**: זמן ההכפלה בשנים הוא בערך $72 \div p$. כאן $72 \div 7 \approx 10.3$ – קרוב מאוד. הכלל טוב לריביות קטנות, של אחוזים בודדים.

שימוש 4 (להעמקה): ריבית כמה פעמים בשנה, והמספר e

לעיתים קרובות הריבית נקובה **לשנה**, אבל מצטרפת לחשבון כל חודש. אם הריבית השנתית היא r (כשבר עשרוני) והיא מצטרפת k פעמים בשנה, אז בכל תקופה מצטרפת ריבית של $\frac{r}{k}$, ובשנה יש k תקופות. אחרי t שנים עוברות $k \cdot t$ תקופות, ובכל אחת מהן הסכום מוכפל ב- $1 + \frac{r}{k}$:

$$M = M_0 \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{k \cdot t}.$$

מה קורה כשמחלקים את השנה ליותר ויותר תקופות? נבדוק קרן של 1 ש"ח, ריבית של 100% לשנה ($r = 1$) ושנה אחת:

מספר התקופות k	1	2	4	12	365	1,000,000
הסכום $\left(1 + \frac{1}{k}\right)^k$	2	2.25	2.4414	2.6130	2.7146	2.71828

הסכום גדל, אבל לא בלי גבול: הוא מתקרב למספר $e \approx 2.71828$. כשהריבית מצטרפת "בכל רגע" (k שואף לאינסוף) מקבלים **ריבית רציפה**:

$$M = \lim_{k \rightarrow \infty} M_0 \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{k \cdot t} = M_0 \cdot e^{rt}.$$

למה? נסמן $m = \frac{k}{r}$ אז

$$\left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt} = \left[\left(1 + \frac{1}{m}\right)^m\right]^{rt},$$

וכש k (ואיתו m) שואף לאינסוף, הביטוי שבסוגריים המרובעים שואף ל- e .

⚠ טעות נפוצה

- q הוא לא האחוז. בריבית של 5% גורם הגדילה הוא $q = 1.05$, לא 5 ולא 0.05.
- האינדקס. $M_n = M_0 \cdot q^n$, ולא $M_0 \cdot q^{n-1}$: אחרי שנה אחת הסכום כבר הוכפל ב- q פעם אחת. בדקו תמיד את $n = 1$.
- אחוזים לא מתחברים. 10% לשנה במשך 3 שנים זה לא 30%, אלא $1.1^3 = 1.331$ — עלייה של 33.1%.
- עלייה ואז ירידה באותו אחוז לא מחזירות לנקודת ההתחלה. עלייה של 20% ואחריה ירידה של 20% הן כפל ב- $0.96 = 1.2 \cdot 0.8$, כלומר ירידה של 4%.
- התקופה והריבית חייבות להתאים. בריבית חודשית n הוא מספר החודשים, ו- p הוא אחוז הריבית לחודש.

🕒 הידעתם?

על לוח חימר מבבל, מלפני כ-3,700 שנה, כתובה שאלה שמוכרת לנו היטב: תוך כמה זמן סכום כסף יוכפל, אם הריבית היא 20% לשנה והיא מצטרפת לקרן?
בשנת 1683 חקר המתמטיקאי השווייצרי יעקב ברנולי בדיוק את השאלה של שימוש 4: מה קורה לריבית של 100% לשנה כשהיא מצטרפת בתדירות גבוהה יותר ויותר. הוא הראה שהתוצאה לא גדלה בלי גבול, ושהיא נמצאת בין 2 ל-3. זה המספר שנקרא היום e . את האות e בחר לאונרד אוילר במאה ה-18.
ברשת מסתובב משפט שמיחוס לאלברט איינשטיין: "ריבית דריבית היא הפלא השמיני בעולם". אין שום מקור שמראה שאיינשטיין באמת אמר אותו — אבל הרעיון שבו נכון.

8 בדקו את עצמכם

✅ שש שאלות קצרות

1. הפקידו 5,000 ₪ בריבית דריבית של 3% לשנה. כמה כסף יהיה בחיסכון אחרי 4 שנים?
2. במעבדה יש 4,096 חיידקים, ומספרם גדל ב-25% בכל שעה. כמה חיידקים יהיו אחרי 3 שעות?
3. ערכו של מחשב יורד ב-20% בכל שנה. אחרי כמה שנים ערכו יהיה לראשונה פחות ממחצית ערכו המקורי?
4. מחיר של מוצר עלה ב-10%, ואחר כך ירד ב-10%. האם המוצר חזר למחירו המקורי?
5. בנק א' נותן ריבית של 12% לשנה, שמצטרפת פעם בשנה. בנק ב' נותן 1% לחודש, שמצטרף כל חודש. באיזה בנק כדאי לחסוך לשנה, ובכמה אחוזים יגדל הסכום בו?
6. ענו על השאלה מתיבת "עצרו ובדקו" בהוכחה 1.

תשובות

1. $q = 1.03$, ולכן $M_4 = 5,000 \cdot 1.03^4 \approx 5,627.54$.
2. $q = 1.25$, ולכן $M_3 = 4,096 \cdot 1.25^3 = 4,096 \cdot 1.953125 = 8,000$ חיידקים.
3. $q = 0.8$. אחרי 3 שנים נשאר $0.8^3 = 0.512$ מהערך – עוד לא פחות מחצי. אחרי 4 שנים נשאר $0.8^4 = 0.4096 < 0.5$ מהערך, ולכן התשובה היא 4 שנים.
4. לא. $1.1 \cdot 0.9 = 0.99$, כלומר המחיר הסופי נמוך ב־1% מהמחיר המקורי.
5. בבנק א' הסכום מוכפל ב־1.12. בבנק ב' הוא מוכפל ב־ $1.01^{12} \approx 1.1268$, כלומר גדל בכ־12.68%. לכן בנק ב' עדיף: כל ריבית חודשית מצטרפת לקרן ומרוויחה ריבית כבר בחודשים הבאים.
6. אז $M_2 = M_1 + \frac{p}{100} \cdot M_0 = M_0 + 2 \cdot \frac{p}{100} \cdot M_0$, ובכל שנה מצטרף אותו סכום, $\frac{p}{100} \cdot M_0$. אחרי n שנים: $M_n = M_0 \left(1 + \frac{n \cdot p}{100}\right)$ זאת הנוסחה של ריבית פשוטה.