

משפט הקוסינוסים

פיתגורס "המשודרג": נוסחה שעובדת בכל משולש, לא רק במשולש ישר-זווית

כ-15 דקות קריאה

3 הוכחות

טריגונומטריה במישור

5 יח"ל

כיתות י'-י"א

מה כדאי לדעת קודם

- משפט פיתגורס.
- $\sin$ ו- $\cos$ במשולש ישר-זווית.
- הזהות $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$.
- לזווית קהה: $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$.
- להוכחה 2: מעגל היחידה ונוסחת המרחק.

מה תמצאו כאן




- אינטואיציה: למה פיתגורס צריך "תיקון" כשהזווית אינה ישרה.
- הוכחה 1: גובה ומשפט פיתגורס, כולל המקרה של זווית קהה.
- הוכחה 2: מערכת צירים, בחישוב אחד שמתאים לכל זווית.
- הוכחה 3: הטלות — בלי משפט פיתגורס, ולכן היא מוכיחה גם אותו.
- דוגמאות, טעויות נפוצות ושאלות לבדיקה עצמית.

1 האינטואיציה: מספריים שנפתחים

האינטואיציה

דמיינו מספריים: שתי זרועות באורכים קבועים a ו- b , שמחוברות בציר. המרחק בין קצות הזרועות נקרא c . ככל שפותחים את המספריים יותר — כלומר מגדילים את הזווית γ שבין הזרועות — הקצוות מתרחקים זה מזה, ו- c גדל.

רק במצב אחד יש לנו כבר נוסחה מוכנה: כשהזווית ישרה, לפי משפט פיתגורס $c^2 = a^2 + b^2$. כשסוגרים את המספריים מעט, c^2 קטן מ- $a^2 + b^2$. כשפותחים אותם מעבר לזווית ישרה, c^2 גדול מ- $a^2 + b^2$. משפט הקוסינוסים הוא פשוט פיתגורס עם "תיקון" שמודד בכמה הזווית רחוקה מ- 90° .



סרטוט 1: אותן שתי זרועות בשלוש זוויות פתיחה שונות. הקו המקווקו הוא c .

דוגמה מספרית קטנה

נבחר $a = 3$ ו- $b = 4$. כשהזווית ישרה, $c = 5$ (המשולש המפורסם 3-4-5). בטבלה רואים איך c^2 "זז" סביב $a^2 + b^2 = 25$, ושמה שמחסירים מ-25 הוא בדיוק $2ab \cos \gamma = 24 \cos \gamma$:

הזווית γ	$24 \cos \gamma$	$c^2 = 25 - 24 \cos \gamma$	c
60°	12	13	≈ 3.61
90°	0	25	5
120°	-12	37	≈ 6.08

בזווית חדה מחסירים מ-25, בזווית ישרה לא משנים דבר, ובזווית קהה מוסיפים ל-25.

2 המשפט

נשתמש בסימון המקובל: במשולש ABC הצלע שמול הקודקוד A היא a , הצלע שמול B היא b , והצלע שמול C היא c . הזוויות שבקודקודים A, B ו- C הן α, β ו- γ .

משפט הקוסינוסים

בכל משולש ABC :

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$

ובאותו אופן, לשתי הצלעות האחרות:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha \quad b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta$$

במילים: ריבוע של צלע שווה לסכום הריבועים של שתי הצלעות האחרות, פחות פעמיים המכפלה שלהן כפול הקוסינוס של הזווית **שביניהן** – כלומר הזווית שמול הצלע הראשונה.

3 הוכחה 1: גובה ומשפט פיתגורס


הרעיון נוריד גובה שיחלק את המשולש לשני משולשים ישרי-זווית. בכל אחד מהם מותר להשתמש בפיתגורס ובהגדרות של $\sin$ ו- $\cos$. אחר כך נחבר את המידע משני החלקים.

מקרה א': הזווית γ חדה

מהקודקוד B נוריד גובה לישר AC , ונסמן את עקב הגובה ב- D (סרטוט 2). נוצרו שני משולשים ישרי-זווית:

- $\triangle BDC$ – היתר שלו הוא a , ואחת מזוויותיו היא γ .
- $\triangle BDA$ – היתר שלו הוא c , הצלע שאותה אנחנו רוצים לחשב.


התוכנית: לחשב את שני הניצבים של $\triangle BDA$ בעזרת a, b ו- γ , ואז להפעיל עליו את פיתגורס.



סרטוט 2: הגובה BD מחלק את $\triangle ABC$ לשני משולשים ישרי-זווית.

נימוק	טענה
ב- $\triangle BDC$ מתקיים $\sin \gamma = \frac{\text{ניצב מול}}{\text{יתר}} = \frac{BD}{a}$	$BD = a \sin \gamma$ ①
ב- $\triangle BDC$ מתקיים $\cos \gamma = \frac{\text{ניצב ליד}}{\text{יתר}} = \frac{DC}{a}$	$DC = a \cos \gamma$ ②
$AD = AC - DC$	$AD = b - a \cos \gamma$ ③
משפט פיתגורס ב- $\triangle BDA$	$c^2 = BD^2 + AD^2$ ④
הצבה של צעדים 1 ו-3	$c^2 = a^2 \sin^2 \gamma + (b - a \cos \gamma)^2$ ⑤
פתיחת סוגריים: $(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$	$c^2 = a^2 \sin^2 \gamma + b^2 - 2ab \cos \gamma + a^2 \cos^2 \gamma$ ⑥
הוצאת a^2 כגורם משותף	$c^2 = a^2 (\sin^2 \gamma + \cos^2 \gamma) + b^2 - 2ab \cos \gamma$ ⑦
$\sin^2 \gamma + \cos^2 \gamma = 1$	$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$ ⑧

מקרה ב': הזווית γ קהה



סרטוט 3: כשהזווית γ קהה, נמצאת מחוץ למשולש.

כשהזווית γ קהה, הגובה מ- B נופל **מחוץ** למשולש, על ההמשך של AC מעבר ל- C . במשולש ישר-הזווית BDC הזווית שבקודקוד C היא עכשיו $\angle BCD = 180^\circ - \gamma$, הזווית הצמודה ל- γ . נשתמש בזוויות של זוויות צמודות:

$$\sin(180^\circ - \gamma) = \sin \gamma$$

$$\cos(180^\circ - \gamma) = -\cos \gamma$$

טענה	נימוק
① $BD = a \sin(180^\circ - \gamma) = a \sin \gamma$	ב- $\triangle BDC$, וזהות הזוויות הצמודות
② $CD = a \cos(180^\circ - \gamma) = -a \cos \gamma$	כנ"ל. זה מספר חיובי, כי $\cos \gamma < 0$
③ $AD = AC + CD = b - a \cos \gamma$	D נמצאת מעבר ל- C
④ $c^2 = BD^2 + AD^2 = a^2 \sin^2 \gamma + (b - a \cos \gamma)^2$	פיתגורס ב- $\triangle BDA$
⑤ $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$	אותו חישוב כמו בצעדים 6-8 במקרה א'

והמקרה של זווית ישרה? אם $\gamma = 90^\circ$, אז $\cos \gamma = 0$, והנוסחה הופכת למשפט פיתגורס עצמו: $c^2 = a^2 + b^2$. כך כיסינו את שלושת המקרים של γ . ואם γ חדה אבל α קהה? אז D נופלת מעבר ל- A , אבל החישוב של מקרה א' עובד גם שם, כי בצעד 5 הביטוי ל- AD מועלה בריבוע (בדקו זאת בתיבה שלמטה).

מש"ל

✓ עצרו ובדקו


בצעד 3 של מקרה א' הנחנו ש- D נמצאת בין A ל- C . מה קורה אם הזווית α קהה, ו- D נופלת מחוץ לקטע, מעבר ל- A ?
רמז: חשבו למה שווה AD במקרה הזה, ומה קורה לביטוי הזה בצעד 5 שם.

🔗 מה למדנו מהוכחה 1

בשני המקרים התקבל **אותו** ביטוי, $AD = b - a \cos \gamma$, אף שבכל מקרה הגענו אליו בדרך אחרת. זה לא מקרי: $a \cos \gamma$ הוא המרחק **עם סימן** מ- C לעקב הגובה D , והסימן של $\cos \gamma$ "יודע" באיזה צד של C נופלת D – לכיוון A או מעבר ל- C . ההוכחה הבאה מנצלת את העובדה הזאת עד הסוף.

4 הוכחה 2: מערכת צירים – חישוב אחד לכל המקרים

הרעיון "נשכיב" את המשולש על מערכת צירים כך שהקודקוד C יהיה בראשית והצלע CA תונח על החלק החיובי של ציר ה- x . אז את c אפשר לחשב כמרחק בין שתי נקודות.



סרטוט 4: המשולש במערכת צירים. המקרה הקהה מסומן באפור.

שיעורי הקודקודים:

- $C = (0, 0)$ – הראשית.
- $A = (b, 0)$ – כי $CA = b$ והצלע מונחת על ציר ה- x .
- $B = (a \cos \gamma, a \sin \gamma)$ – נקודה במרחק a מהראשית, על קרן שיוצרת זווית γ עם ציר ה- x החיובי.

השיעורים של B נובעים מהגדרת $\sin$ ו- $\cos$ במעגל היחידה, ולכן הם נכונים **לכל** זווית $0^\circ < \gamma < 180^\circ$: ישרה או קהה. כשהזווית קהה, $\cos \gamma < 0$, והנקודה B פשוט נמצאת משמאל לציר ה- y .


נחשב את $c = AB$ בעזרת נוסחת המרחק $d^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$:

טענה	נימוק
① $c^2 = (a \cos \gamma - b)^2 + (a \sin \gamma - 0)^2$	נוסחת המרחק בין A ל- B
② $c^2 = a^2 \cos^2 \gamma - 2ab \cos \gamma + b^2 + a^2 \sin^2 \gamma$	פתיחת סוגריים
③ $c^2 = a^2 (\cos^2 \gamma + \sin^2 \gamma) + b^2 - 2ab \cos \gamma$	סידור מחדש והוצאת a^2
④ $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$	$\sin^2 \gamma + \cos^2 \gamma = 1$

מש"ל

אין כאן מקרים בכלל: את "העבודה השחורה" – לבדוק אם הגובה נופל בפנים או בחוץ – עשה בשבילנו מעגל היחידה, שמגדיר את $\cos$ גם לזוויות קהות.

5 הוכחה 3: הטלות – בלי משפט פיתגורס



סרטוט 5: הגובה CH מחלק את c לשתי הטלות.

הרעיון נוריד מ- C גובה לישר AB , ונסמן את עקבו H . הגובה מחלק את הצלע c לשני קטעים, AH ו- HB – **ההטלות** של הצלעות b ו- a על c . במשולשים ישרי-הזווית AHC ו- BHC :

$$AH = b \cos \alpha, \quad HB = a \cos \beta.$$

ולכן כל צלע היא סכום ההטלות של שתי הצלעות האחרות עליה: $c = a \cos \beta + b \cos \alpha$.

ואם אחת הזוויות קהה? נניח ש- α קהה. אז H נופלת מעבר ל- A , והצלע c היא **הפרש** של שני קטעים. כיוון ש- $HA = b \cos(180^\circ - \alpha) = -b \cos \alpha$, מקבלים

$$c = HB - HA = a \cos \beta + b \cos \alpha,$$

כלומר הקוסינוס השלילי "מחסר" את הקטע בעצמו. וכש- α ישרה, $H = A$ ו- $b \cos \alpha = 0$. לכן נוסחת ההטלות נכונה בכל משולש.

טענה	נימוק
① $c = a \cos \beta + b \cos \alpha$	ההטלות על c (הגובה מ- C)
② $b = a \cos \gamma + c \cos \alpha, a = b \cos \gamma + c \cos \beta$	אותו נימוק, עם הגבהים מ- A ומ- B
③ $c^2 = ac \cos \beta + bc \cos \alpha$	כפל צעד 1 ב- c
④ $a^2 + b^2 = 2ab \cos \gamma + ac \cos \beta + bc \cos \alpha$	כפל שני השוויונות של צעד 2 ב- a וב- b , וחיבור
⑤ $a^2 + b^2 - c^2 = 2ab \cos \gamma$	צעד 4 פחות צעד 3: שני האיברים האחרונים מתבטלים
⑥ $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$	העברת אגפים

מש"ל

בנוסף. בהוכחה הזאת לא השתמשנו במשפט פיתגורס, וגם לא בזהות $\sin^2 \gamma + \cos^2 \gamma = 1$. לכן מותר להציב בה $\gamma = 90^\circ$: מקבלים $c^2 = a^2 + b^2$. כלומר משפט הקוסינוסים לא רק **מכליל** את משפט פיתגורס – הוא גם מוכיח אותו.

6 שלוש הדרכים זו מול זו

הוכחה 1: גובה ופיתגורס	הוכחה 2: מערכת צירים	הוכחה 3: הטלות	
הרעיון	לפרק את המשולש לשני משולשים ישרי-זווית	כל צלע היא סכום ההטלות של שתי האחרות	
הכלים	פיתגורס, $\sin$ ו- $\cos$ במשולש ישר-זווית, זוויות צמודות	$\cos$ במשולש ישר-זווית, ואלגברה	
מקרים	זווית חדה וזווית קהה בנפרד	חישוב אחד לכל זווית	הקוסינוס השלילי מטפל בזווית הקהה
היתרון	"רואים" בסרטוט מאיפה מגיע כל איבר	קצרה ואלגנטית, בלי סרטוטים מסובכים	בלי פיתגורס – ולכן מוכיחה גם אותו

7 מה עושים עם המשפט?

שימוש 1: מוצאים צלע משתי צלעות והזווית שביניהן

דוגמה מספרית

במשולש $a = 5$, $b = 8$ ו- $\gamma = 60^\circ$. מצאו את c .
 $c^2 = 5^2 + 8^2 - 2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \cos 60^\circ = 25 + 64 - 80 \cdot \frac{1}{2} = 89 - 40 = 49$.
 ולכן $c = 7$.

שימוש 2: מוצאים זווית משלוש צלעות

מבודדים את $\cos \gamma$ מהמשפט:

$$\cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}.$$

דוגמה מספרית

הצלעות של משולש הן 7 ו-8. מצאו את הזווית שמול הצלע שאורכה 7.

$$\cos \gamma = \frac{5^2 + 8^2 - 7^2}{2 \cdot 5 \cdot 8} = \frac{40}{80} = \frac{1}{2}$$

ולכן $\gamma = 60^\circ$.

שימוש 3: חדה, ישרה או קהה – בלי לחשב זווית

מהנוסחה $\cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$ רואים שהסימן של $\cos \gamma$ נקבע לפי הסימן של $a^2 + b^2 - c^2$:

$c^2 > a^2 + b^2$	$c^2 = a^2 + b^2$	$c^2 < a^2 + b^2$
γ קהה	γ ישרה	γ חדה

לדוגמה, במשולש שצלעותיו 4, 5 ו-7 מתקיים $7^2 = 49 > 16 + 25 = 41$, ולכן הזווית שמול הצלע 7 קהה. מספיק לבדוק את הזווית שמול הצלע הארוכה ביותר, כי רק היא יכולה להיות ישרה או קהה.

⚠ טעות נפוצה

- **זווית לא נכונה.** ב- $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$ הזווית חייבת להיות בין a ל- b , כלומר מול c . זווית אחרת במשולש תיתן תוצאה שגויה.
- **סדר פעולות.** מחשבים קודם את $2ab \cos \gamma$, ורק אחר כך מחסירים. " $(a^2 + b^2 - 2ab) \cdot \cos \gamma$ " שגוי.
- **מינוס כפול מינוס.** בזווית קהה $\cos \gamma < 0$, ולכן $-2ab \cos \gamma$ הוא מספר חיובי. למשל, ב- $\gamma = 120^\circ$ מקבלים $-2ab \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = +ab$.
- **המחשבון.** ודאו שהמחשבון מוגדר למעלות (DEG) ולא לרדיאנים.

הידעתם?

את המשפט אפשר למצוא כבר ב"יסודות" של אוקלידס (בערך 300 לפני הספירה), בספר השני, טענות 12 ו-13. אוקלידס עוד לא הכיר קוסינוס, ולכן ניסח את המשפט בשפה של שטחי מלבנים, ובשתי טענות נפרדות: אחת למשולש קהה-זווית ואחת למשולש חד-זווית – בדיוק כמו שני המקרים בהוכחה 1. הניסוח הטריגונומטרי שאנחנו מכירים התפתח רק יותר מאלף שנה אחר כך. המתמטיקאי הפרסי ע'יאת' אדין ג'משיד אל-כאשי (המאה ה-15) הציג אותו בצורה נוחה לחישובים. לכבודו, בספרי הלימוד בצרפת קוראים למשפט, מאז שנות ה-90 של המאה ה-20, "משפט אל-כאשי".

8 בדקו את עצמכם

חמש שאלות קצרות

1. במשולש $a = 3, b = 5$ ו- $\gamma = 120^\circ$. מצאו את c .
2. במקרה ב' של הוכחה 1 קיבלנו $CD = -a \cos \gamma$. איך ייתכן שאורך של קטע שווה למספר עם מינוס?
3. צלעות המשולש הן 6, 7 ו-10. האם המשולש חד-זווית, ישר-זווית או קהה-זווית?
4. כתבו את משפט הקוסינוסים עבור הצלע b .
5. מה קורה בהוכחה 1 אם הזווית α קהה? (זאת השאלה מתיבת "עצרו ובדקו").

תשובות

1. $c^2 = 9 + 25 - 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 34 + 15 = 49$ ולכן $c = 7$.
2. כי γ קהה, ולכן $\cos \gamma < 0$. המספר $-a \cos \gamma$ הוא חיובי, והוא אכן האורך של CD .
3. הצלע הארוכה היא 10, ו- $10^2 = 100 > 6^2 + 7^2 = 85$, ולכן המשולש קהה-זווית.
4. $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta$.
5. אז D נמצאת מעבר ל- A , ו- $AD = DC - AC = a \cos \gamma - b$, זה הנגדי של $b - a \cos \gamma$, ובצעד 5 מעלים אותו בריבוע – ולכן התוצאה זהה: $(a \cos \gamma - b)^2 = (b - a \cos \gamma)^2$.